

## Symptomatik vorrangig

(Ausmaß der Lungenfunktionseinschränkungen berücksichtigen)

Leichte -  
mittelgradige  
Symptomatik

- Keine Therapie  
oder
- SAMA oder SABA  
bei Bedarf  
oder
- LAMA oder LABA

mittelgradige -  
schwergradige  
Symptomatik

- LAMA oder LABA  
oder
- LAMA + LABA

## Aufgetretene Exazerbationen vorrangig

Therapienaiv?

↓ Ja

- LAMA oder LABA  
oder
- LAMA + LABA

↓ Nein<sup>Q</sup>

- LAMA + LABA

### Eskalationsstufen

Vorbehandelt mit:

- LAMA

Eskalation auf:

- LAMA + LABA

- LAMA + LABA  
oder
- LABA + ICS

- LAMA + LABA +  
ICS

Ggf. Roflumilast  
(als Add On zu  
LAMA + LABA  
oder  
LAMA - LABA + ICS)

<sup>Q</sup> Vor jeder Eskalation ist die Adhärenz zur medikamentösen Therapie sowie die Inhalationstechnik zu prüfen.

LAMA: Langwirkende Anticholinergika (long-acting muscarinic antagonist), LABA: Langwirkende Beta-2-Sympathomimetika (long-acting beta2-agonist), ICS: Inhalatives Corticosteroid, SABA: kurzwirkende Beta-2-Sympathomimetika, SAMA: kurzwirkende Anticholinergika