

## Programm

### Online-Launch-Pressekonferenz

## Neu zugelassen: Verzenios\* als erster und einziger CDK4 & 6 Inhibitor jetzt auch in der adjuvanten Therapie des frühen HR+, HER2- Mammakarzinoms

Mittwoch, 04.05.2022, 16:00 – 17:00 Uhr

#### Ihre Ansprechpartner:

Weber Shandwick Frankfurt  
Speicherstraße 59  
60327 Frankfurt a. M.  
Name: Janina Baumann  
Telefon: 069 91304342  
eMail: jbaumann@webershandwick.com

Lilly Deutschland GmbH  
Werner-Reimers-Straße 2-4  
61352 Bad Homburg  
www.lilly-pharma.de  
Name: Susanne Uthmann  
Telefon: 0172 2672 108  
eMail: uthmann\_susanne@lilly.com

- 15:45 Uhr **Get-Together im virtuellen Warteraum**
- 16:00 Uhr **Begrüßung und Einführung**  
Susanne Uthmann  
Senior Communications Manager, Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg  
Clemens Stoffregen  
Associate VP Medical, Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg
- 16:10 Uhr **Prognostische Faktoren in der Therapie des frühen Mammakarzinoms: der unmet medical need bei hohem Risiko**  
Prof. Dr. Peter Fasching  
Oberarzt in der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen
- 16:30 Uhr **Vorstellung der aktuellen Daten der monarchE-Studie<sup>2</sup> und deren Einordnung in die Therapielandschaft**  
Prof. Dr. Nadia Harbeck  
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Leitung Brustzentrum und Onkologische Tagesklinik der Frauenklinik der Universität München
- 16:55 Uhr **Diskussion und Zusammenfassung**
- 17:00 Uhr **Ende der Launch-Pressekonferenz**

PP-AL-DE-1367

\* Abemaciclib (Verzenios<sup>®</sup>) ist in Kombination mit einer endokrinen Therapie angezeigt für die adjuvante Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit HR+, HER2- nodal-positivem Brustkrebs im frühen Stadium mit einem hohen Rezidivrisiko<sup>#</sup>. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen sollte die endokrine Aromatasehemmer-Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Luteinising Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden.<sup>1</sup>

<sup>#</sup> Hohes Rezidivrisiko definiert als  $\geq 4$  positive axilläre Lymphknoten (paLN) oder 1-3 paLN und mind. eines der folgenden Kriterien: Tumorgröße  $\geq 5$ cm oder histologischer Grad 3.

<sup>1</sup> Fachinformation Verzenios, aktueller Stand, [www.lilly-pharma.de/de/pdf/fachinformation/fachinformation\\_verzenios.pdf](http://www.lilly-pharma.de/de/pdf/fachinformation/fachinformation_verzenios.pdf)

<sup>2</sup> Harbeck N et al. Adjuvant abemaciclib combined with endocrine therapy for high-risk early breast cancer: updated efficacy and Ki-67 analysis from the monarchE study. Ann Oncol 2021 Dec;32(12):1571-1581. doi: 10.1016/j.annonc.2021.09.015. Epub 2021 Oct 14