

Programm

Online-Pressegespräch

Erste Erfahrungen aus der Praxis: Abemaciclib^a in der adjuvanten Therapie des HR+, HER2- Mammakarzinoms

Dienstag, 26. Juli 2022, 16:30 – 17:30 Uhr

Ihre Ansprechpartner:

Weber Shandwick Frankfurt
Speicherstraße 59
60327 Frankfurt a. M.
Name: Janina Baumann
Telefon: 069 913 043 42
eMail: jbaumann@webershandwick.com

Lilly Deutschland GmbH
Werner-Reimers-Straße 2-4
61352 Bad Homburg
www.lilly-pharma.de
Name: Susanne Uthmann
Telefon: 0172 2672 108
eMail: uthmann_susanne@lilly.com

- | | |
|-----------|--|
| 16:15 Uhr | Get-Together im virtuellen Warteraum |
| 16:30 Uhr | Begrüßung und Vorstellung der Referentin
Susanne Uthmann, Lilly Deutschland, Bad Homburg |
| 16:35 Uhr | Abemaciclib^a in der adjuvanten Therapie des HR+, HER2- Mammakarzinoms: Erste Erfahrungen aus der Praxis
<i>Dr. Mattea Reinisch</i> , Stellv. Direktorin und Oberärztin der Klinik für Senologie / Interdisziplinäres Brustkrebszentrum und Leitung des Brustzentrums in den Evang. Kliniken Essen-Mitte |
| 17:10 Uhr | Fazit und Diskussion |
| 17:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |

^a Abemaciclib (Verzenio[®]) ist in Kombination mit einer endokrinen Therapie angezeigt für die adjuvante Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit HR+, HER2- nodal-positivem Brustkrebs im frühen Stadium mit einem hohen Rezidivrisiko[#]. Bei prä- oder perimenopausalen Frauen sollte die endokrine Aromatasehemmer-Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Luteinising Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden. [Fachinformation Verzenio, aktueller Stand; www.lilly-pharma.de/verzenio].

[#] Hohes Rezidivrisiko definiert als ≥ 4 positive axilläre Lymphknoten (paLN) oder 1-3 paLN und mind. eines der folgenden Kriterien: Tumorgroße ≥ 5 cm oder histologischer Grad 3.